



DE NIJS

Roslin

FOB02-136-66R x Red Valentine

J. Heidemans / Fobek

Algemeen advies voor de consumptieteelt



Vroeg

Grove knollen

Hoge opbrengst in Middellandse Zeegebied

Weinig gevoelig voor stootblauw

Sterk tegen doorwas en wind

Raseigenschappen

Rijptijd	7	vroeg
Opkomst	5,5	redelijk
Loofontwikkeling	7	goed
Bessen	6	redelijk veel
Schilkleur	7	rood
Vleeskleur	5	crème wit
Knolvorm	llo	lang - lang ovaal
Oogdiepte	7	vlak
Regelmaat knolvorm	7	uniform
Grootte knol	8	groot
Sortering	7	uniform
Knolaantal	8-11	laag

Raskwaliteiten

Kiemrust	7	lang
Onderwatergewicht	340	
Droge stof %	18,71	
Zetmeel %	12,87	
Kooktype	A - AB	vast-iets vast
Verkleuring	6,5	zeer licht
Frites	-	n.v.t.
Chips	-	n.v.t.

Gebruik



Resistenties / toleranties

Aardappelmoetheid	Ro1,4	AF
Wratziekte	1	immuun
Onderzeeërvorming	-	onbekend
Sencorgevoeligheid	2	gebruik voor opkomst
Phytophthora loof	4	vatbaar
Phytophthora knol	7	weinig vatbaar
Alternaria	-	onbekend
Erwinia	-	onbekend
Doorwas	7,5	weinig gevoelig
Droogtetolerantie	7	weinig gevoelig
Hittetolerantie	7,5	weinig gevoelig

Resistenties / toleranties

Y-virus	6	vatbaar
Yntn-virus	7	matig gevoelig
Kringerigheid	5	vatbaar
Rooibeschatiging	7	weinig gevoelig
Blauwgevoeligheid	6-10	weinig gevoelig
Fusarium	-	onbekend
Zilverscurft	5,5	vatbaar
Scurft	5,5	weinig vatbaar
Poederscurft	7	resistent

Algemeen advies voor de consumptieteelt

Voorbehandeling pootgoed en poten

- Dit ras heeft een lange kiemrust, het gebruik van voorgekiemd pootgoed is daarom zeer effectief.
- Poot de aardappel op maaivelddiepte en in voldoende warme grond met een goede structuur!
- Voor het poten knollen behandelen tegen *Rhizoctonia* en zilverschurft.
- De aardappel kan gepoot worden op iets schurftgevoelige grondsoorten.

Pootafstanden *Op zwaardere gronden de kleinste pootafstand aanhouden.

Pootgoed maat	28/35	35/55	55/65	35/55 gesneden
Plantafstand	-	30-36 cm	-	30 cm

Bemesting (inclusief bodemvoorraad)

N	± 180 - 220 kg	Inclusief N-min (2/3 voor poten, de rest als overbemesting)
P	Normaal	Volgens bodemanalyse
K	Normaal	Volgens bodemanalyse
Mg, Mn, Ca, Bo		Als bladmeststof geven; deze micro-elementen werken stimulerend op de groei en hebben een positief effect op de kwaliteit

Teelt

- Het ras heeft een redelijke opkomst met een goede loofontwikkeling.
- Houd een strak schema voor Phytophthorabesputingen aan, dit omdat het ras vatbaar is in het loof.

Loofdoding, oogst en bewaring

- Na loofvernietiging de aardappelen voldoende laten afharden, kijk ook naar de rijpheid van het gewas.
- Zorg voor een snelle droging om zilverschurft te voorkomen (gebruik desnoods kachels). Zorg ervoor dat het wondhelingsproces goed verloopt.
- Als de partij droog is de temperatuur langzaam terugbrengen naar 5-6°C.