



DE NIJS

Armin

Fabula x Carrera

F. Zwart / Fobek

Algemeen advies voor de consumptieteelt



Gladde schil

Heldere schil

Sterk tegen groeischeuren

Hoge opbrengst in Middellandse Zeegebied

Sterk tegen vleesgebreken

Raseigenschappen

Rijptijd	6	midden
Opkomst	7	normaal
Loofontwikkeling	7	goed
Bessen	3	zeer weinig
Schilkleur	3	geel
Vleeskleur	6	crème
Knolvorm	10	lang ovaal
Oogdiepte	7	vlak
Regelmaat knolvorm	7	uniform
Grootte knol	8	groot
Sortering	7	uniform
Knolaantal	11-15	gemiddeld

Raskwaliteiten

Kiemrust	7	lang
Onderwatergewicht	350	
Droge stof %	19,21	
Zetmeel %	13,35	
Kooktype	A - AB	vast-iets vast
Verkleuring	8	geen
Frites	6	gemiddeld
Chips	-	n.v.t

Gebruik



Resistenties / toleranties

Aardappelmoehheid	Ro1	A
Wratziekte	1	immuun
Onderzeeërvorming	-	onbekend
Sencorgevoeligheid	2	gebruik voor opkomst
Phytophthora loof	5,5	weinig vatbaar
Phytophthora knol	7	weinig vatbaar
Alternaria	7	resistent
Erwinia	6	matig gevoelig
Doorwas	6	matig gevoelig
Droogtetolerantie	7,5	weinig gevoelig
Hittetolerantie	7	weinig gevoelig

Resistenties / toleranties

Y-virus	5,5	vatbaar
Yntn-virus	8,5	weinig gevoelig
Kringerigheid	9	hoog resistent
Rooibeschatiging	7	weinig gevoelig
Blauwgevoeligheid	11-15	vrij gevoelig
Fusarium	5,5	vatbaar
Zilverschorft	6	vatbaar
Schorft	5,5	weinig vatbaar
Poederschorft	5	vatbaar



DE NIJS

Armin

Fabula x Carrera

F. Zwart / Fobek

Algemeen advies voor de consumptieteelt

Voorbehandeling pootgoed en poten

- Armin heeft een vrij lange kiemrust, het gebruik van voorgekiemd pootgoed is daarom zeker effectief.
- Poot de aardappel rond het maaiveld en niet in te koude grond met een goede structuur!
- Voor het poten de grond/knollen behandelen tegen *Rhizoctonia*, *fusarium* en zilverschurft.
- De aardappel kan gepoot worden op iets schurftgevoelige grondsoorten.

Pootafstanden

*Op zwaardere gronden de kleinste pootafstand aanhouden.

Pootgoed maat	28/35	35/55	55/65	35/55 gesneden
Plantafstand	22-26 cm	28-33 cm	35-39 cm	30 cm

Bemesting (inclusief bodemvoorraad)

N	± 200 - 250 kg	Inclusief N-min (2/3 voor poten, eventueel rest na het poten)
P	Normaal	Volgens bodemanalyse
K	± 300 kg	Volgens bodemanalyse
Mg, Mn, Ca, Bo		Als bladmeststof geven; deze micro-elementen werken stimulerend op de groei en hebben een positief effect op de kwaliteit

Teelt

- Armin komt goed en gelijkmatig op en heeft een goede loofontwikkeling.
- Wees voorzichtig met het gebruik van Sencor, gebruik indien nodig voor opkomst.
- Het ras iets gevoelig is voor schurft, zorg voor een goede vochtvoorziening, speciaal bij de knolzetting.
- Normale Phytophthora-bespuitingen uitvoeren, later in het seizoen overgaan op middelen met meer knolbescherming.

Loofdoding, oogst en bewaring

- Na loofvernietiging de aardappelen voldoende laten afharden, kijk ook naar de rijpheid van het gewas.
- Het is goed om de knollen te behandelen tegen bewaarziekten.
- Zorg voor een snelle droging om zilverschurft te voorkomen (gebruik desnoods kachels). Zorg dat het wondhelingsproces goed verloopt.
- Als de partij droog is de temperatuur langzaam terugbrengen naar 5-7°C. Voorkom condensvorming in de bovenlaag van de hoop!