



DE NIJS

Fidelia

1.742 102-95 x Filea

Norika

Algemeen advies voor de consumptieteelt



Uniforme maatsortering

Sterk tegen beschadiging en vleesgebreken

Vrij sterk tegen Phytophthora

Goede consumptiekwaliteit

Goede bewaarbaarheid

Raseigenschappen

Rijptijd	7	vroeg
Opkomst	7,5	normaal
Loofontwikkeling	8	goed
Bessen	4	weinig
Schilkleur	3	geel
Vleeskleur	8	geel
Knolvorm	olo	ovaal - lang ovaal
Oogdiepte	7	vlak
Regelmaat knolvorm	8	uniform
Grootte knol	7	groot
Sortering	7	uniform
Knolaantal	11-15	gemiddeld

Raskwaliteiten

Kiemrust	7	lang
Onderwatergewicht	335	
Droge stof %	18,47	
Zetmeel %	12,63	
Kooktype	A - AB	vast-iets vast
Verkleuring	8	geen
Frites	-	n.v.t.
Chips	-	n.v.t.

Gebruik



Resistenties / toleranties

Aardappelmoehheid	Ro1, Ro4	AF
Wratziekte	1	immuun
Onderzeeërvorming	8,5	ongevoelig
Sencorgevoeligheid	2	gebruik voor opkomst!
Phytophthora loof	5,5	weinig vatbaar
Phytophthora knol	7,5	resistent
Alternaria	6	weinig vatbaar
Erwinia	8	weinig gevoelig
Doorwas	8	weinig gevoelig
Droogtetolerantie	8	weinig gevoelig
Hittetolerantie	7,5	weinig gevoelig

Resistenties / toleranties

Y-virus	7	weinig vatbaar
Yntn-virus	8	weinig gevoelig
Kringerigheid	8	resistent
Rooibeschatiging	8	weinig gevoelig
Blauwgevoeligheid	0-5	ongevoelig
Fusarium	7,5	weinig vatbaar
Zilverschurft	7	weinig vatbaar
Schurft	6,5	weinig vatbaar
Poederschurft	-	onbekend





DE NIJS

Fidelia

1.742 102-95 x Filea

Norika

Algemeen advies voor de consumptieteelt

Voorbehandeling pootgoed en poten

- Fidelia heeft een goede kiemrust, het gebruik van voorgekiemd pootgoed is daarom zeker effectief.
- Poot de aardappelen \pm 2 cm onder maaiveldveld, niet in een te koude grond en met een goede structuur!
- Voor het poten de grond/knollen behandelen tegen *Rhizoctonia en* zilverschurft.
- De aardappel kan gepoot worden op iets schurftgevoelige grondsoorten.

Pootafstanden

*Op zwaardere gronden de kleinste pootafstand aanhouden.

Pootgoed maat	28/35	35/55	55/65
Plantafstand	-	26-28 cm	-

Bemesting (inclusief bodemvoorraad)

N	\pm 150 - 170 kg	Inclusief N-min (2/3 voor poten, eventueel de rest als overbemesting)
P	Normaal	Volgens bodemanalyse
K	\pm 210 - 240 kg	Volgens bodemanalyse
Mg, Mn, Ca, Bo		Als bladmeststof geven; deze micro-elementen werken stimulerend op de groei en hebben een positief effect op de kwaliteit

Teelt

- Zorg bij het frezen/aanaarden voor een goede brede/volle rij.
- Gebruik Sencor voor opkomst.
- Fidelia komt goed op en heeft een sterke loofontwikkeling met sterke dikke stengels.
- Door te beregenen tijdens de knolzetting kan dit resulteren in minder schurft en meer knollen.
- Controleer het gewas op Phytophthora, voer indien nodig een bespuiting uit.

Loofdoding, oogst en bewaring

- Na loofvernietiging de aardappelen voldoende laten afharderen, kijk ook naar de rijpheid van het gewas.
- Zorg voor een snelle droging om zilverschurft te voorkomen (gebruik desnoods kachels). Zorg ervoor dat het wondhelingsproces goed verloopt.
- Als de partij droog is de temperatuur langzaam terugbrengen naar 6-7°C. Voorkom condensvorming in de bovenlaag van de hoop!