

Bleuet

K3684 x (FOB 99-034-042PR x Crispy)

P. van der Schaaf / Fobek

Algemeen advies voor de consumptieteelt



Gezonde aardappel

Gladde paarse schil met paars vlees

Goede consumptie kwaliteit

Kooktype: vast-iets vast

Geschikt voor teelt in Europa

Raseigenschappen

Rijptijd	8	vroeg
Opkomst	8	vlot
Loofontwikkeling	8	goed
Bessen	3	zeer weinig
Schilkleur	9	paars
Vleeskleur	3	paars
Knolvorm	ro	rond ovaal
Oogdiepte	7	vlak
Regelmaat knolvorm	7	uniform
Grootte knol	6	redelijk
Sortering	7	uniform
Knolaantal	11-15	gemiddeld

Raskwaliteiten

Kiemrust	7	lang
Onderwatergewicht	320	
Droge stof %	17,73	
Zetmeel %	11,92	
Kooktype	A - AB	vast-iets vast
Verkleuring	8	geen
Frites	-	n.v.t.
Chips	-	n.v.t.

Gebruik



Resistenties / toleranties

Aardappelmoehheid	Ro1	A
Wratziekte	1	immuun
Onderzeeërvorming	7	weinig gevoelig
Sencorgevoeligheid	7	weinig gevoelig
Phytophthora loof	5	vatbaar
Phytophthora knol	7	weinig vatbaar
Alternaria	-	onbekend
Erwinia	8	weinig gevoelig
Doorwas	7	weinig gevoelig
Droogtetolerantie	7	weinig gevoelig
Hittetolerantie	7	weinig gevoelig

Resistenties / toleranties

Y-virus	7	weinig vatbaar
Yntn-virus	7	matig gevoelig
Kringerigheid	7	resistent
Rooibeschatiging	5	gevoelig
Blauwgevoeligheid	0-5	ongevoelig
Fusarium	4	zeer vatbaar
Zilverfurf	5,5	vatbaar
Schurf	5	vatbaar
Poedersurf	5	vatbaar

Bleuet

K3684 x (FOB 99-034-042PR x Crispy)

P. van der Schaaf / Fobek

Algemeen advies voor de consumptieteelt

Voorbehandeling pootgoed en poten

- Bleuet heeft een gemiddelde kiemrust, het gebruik van voorgekiemd pootgoed is daarom zeer effectief.
- Poot de aardappelen 1 à 2 cm onder het maaiveld, poten in een grond met een goede structuur.
- Grond of knolbehandeling tegen *Rhizoctonia*, zilverschurft en zwarte spikkel wordt aanbevolen.

Pootafstanden

*Op zwaardere gronden de kleinste pootafstand aanhouden.

Pootgoed maat	28/35	35/50	50/60
Plantafstand	15-20 cm	20-25 cm	25-30 cm

Bemesting (inclusief bodemvoorraad)

N	± 130 - 180 kg	Inclusief N-min (2/3 voor poten, eventueel 1/3 als overbemesting)
P	Normaal	Volgens bodemanalyse
K	Normaal	Volgens bodemanalyse
Mg, Mn, Ca, Bo		Als bladmeststof geven; deze micro-elementen werken stimulerend op de groei en hebben een positief effect op de kwaliteit

Teelt

- Bleuet kan goed geteeld worden in Europa.
- Het ras heeft een snelle opkomst met een goede loofontwikkeling.
- Verdraagt herbiciden Sencor (Metribuzin) en Boxer (Prosulfocarb), wees voorzichtig met de dosering.
- Normale Phytophthora-bespuitingen uitvoeren, het Bleuet is vatbaar in het loof en knol weinig vatbaar.

Loofdoding, oogst en bewaring

- Na loofvernietiging de aardappelen voldoende laten afharden, kijk ook naar de rijpheid van het gewas.
- Zorg voor een snelle droging om zilverschurft te voorkomen (gebruik desnoods kachels). Zorg dat het wondhelingsproces goed verloopt.
- Als de partij droog is de temperatuur langzaam terugbrengen naar 6°C. Voorkom condensvorming in de bovenlaag van de hoop!
- Het ras kan langdurig bewaard worden bij een temperatuur van 6°C.